



Il est nécessaire d'avoir un comportement responsable lors d'un rapport sexuel, que ce soit en matière de respect de son partenaire, de maîtrise de la fertilité ou de protection contre la transmission de maladies.


I. Les IST

Les **moyens de contraception** variés permettent d'éviter les non désirées. Mais les rapports sexuels sont aussi facteurs de transmission d'..... sexuellement transmissibles. C'est pourquoi il faut avoir un comportement vis-à-vis de sa sexualité, afin de **se protéger** et de **protéger les autres**.

♥ **IST** : signifie Infection Sexuellement Transmissible. Ce sont les infections transmises lors des rapports sexuels non ou mal protégés.

Il existe une **trentaine** d'IST, dues à des agents infectieux comme des, des ou des

Le **SIDA** est une IST. Il est causé par le du VIH. Chez la femme, comme chez l'homme, il cause un déficit qui entraîne la De nombreuses campagnes de sensibilisations ont été mises en place pour informer la population depuis la découverte de ce virus en 1983.



D'autres IST sont dues à des, comme la **chlamydie** ou la **syphilis**.

Deux exemples d'ist

Chlamydie	Syphilis
Bactérie	Bactérie
Transmission facile	Transmission facile
Femme : fièvre, douleur au ventre, infertilité Homme : brûlure en urinant	Femme : plaie indolore sur le sexe, puis problèmes neurologiques
Dépistage simple	Dépistage simple
Traitement par antibiotiques	Traitement par antibiotiques

Les IST concernent tous les couples, **hétérosexuels, homosexuels** ou **bisexuels**.

II. La prévention des IST

Il existe néanmoins des moyens pour se protéger des IST.

Le est idéal pour ça : il forme une **barrière** qui empêche la des microbes d'un partenaire à l'autre.

De plus, il est possible de se faire **dépister** en allant chez un, un g....., ou encore des centres de diagnostics et de dépistages.

Il existe également des contre certaines maladies. C'est le cas du papillomavirus par exemple, qui peut causer l'apparition de cancers du s'il n'est pas détecté à temps.